




پروتکل مسمومیت با اپیوم



➤ در بیماران مسمومیت از خوردن شیر و ... و همچنین تحریک استفراغ خودداری گردد.

➤ در صورت شک به مسمومیت کلسیم بلاکرها (وراپامیل، دیلتیازیم و...) و بتابلاکرها (پروپرانول و...) و ضد افسردگی های سه حلقه ای (آمیتریپتیلین و ایمی پرامین و ...) و داروهای قلبی عروقی و آراکائوفسفره ها استفاده از مانیتورینگ قلبی (در صورت امکان) ضروری می باشد.

➤ در صورت تشنج از تجویز فنی توئین پرهیز شود و از بنزودیازپین استفاده گردد.

۱ یک آمیول را با 4cc نرمال سالین رقیق کرده و هر ۲ دقیقه 1cc تزریق نماید.

۲ رفع علائم شامل بهبود تنفس و افزایش Spo₂ میباشد.

*در صورت نیاز به اکسیژن درمانی استفاده از نازل کانولا و در صورت O₂sat کمتر از ۹۵٪ استفاده از روش های با غلظت بالاتر

سایر علل میوز شامل:

مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین SSRIs - آراکائوفسفره - CO - ضدافسردگی های سه حلقه ای TCA - ضایعات مغزی - خونریزی پونز و ...